

Rosa sherardii Davies

Ruža Sherardova

Ic.: Tab. 4, fig. 3, p. 49

Rosa sherardii Davies Welsh. Botanol. 1, p. 49, 1813.Syn.: *Rosa omissa* Déséglise – *R. scabriuscula* auct. non Sm. – *R. tomentosa* Sm. subsp. *pseudoscabriuscula* R. Keller.

Mnohotvárny, rozložitý až 200 cm vysoký prútnatý ker, podzemnými poplazmi pospájaný v riedke polykormóny s oblúkovite ohnutými hlavnými konármami a krátkymi kvetonosnými konárikmi v každom uzle meniacimi smer rastu listov (zľava doprava). Prílistky úzke, prirastené k listovej stopke, chlpaté, na okraji žliazkaté. Listy opadávajúce, striedavé, nepárnou perovitou zloženou, 5–7-jarmové, sivozelené, husto po oboch stranách chlpaté, na rube až plstnaté, zväčša aspoň na rube, niekedy aj na líci žliazkaté, žliazky sediace, voňajúce po terpentíne. Čepielky lístkov elipsovité až predĺžene elipsovité alebo vajcovité, zväčša končisté, až dlhokončisté, na báze klinovité až široko (okrúhlo) klinovité, pravidelne dvojito ostro pílkovité, husto žliazkaté. Ostne riedke, zväčša stíhle a z oboch strán stlačené, priame alebo mierne dolu ohnuté, nepravidelne rozložené, zväčša na dlhých predlžovacích, kvetonosných konárikoch infrastipulárne. Kvety v chudobných súkvetiach, zriedka jednotlivé. Vonkajšie kališné lístky ± perovitou strihané, po stranach a na rube žliazkaté, po odkvitnutí sa vzpriamujúce a navzájom sa dotýkajúce, výnimočne nepravidelne rozložené. Korunné lupienky sýtoružové. Tyčiniek mnoho, peňnice žlté; čnelky husto vlnato chlpaté. Disk plochý alebo mierne kužeľovitý, ústie široké. Stopky plodov nerovnako dlhé, v terminálnej časti súplodia kratšie, na postranných častiach takmer vždy stopkatožliazkaté, niekedy aj chlpaté. Šípky guľovité až vajcovité, hruškovité. Nažiek mnoho, bledožltých.

Chromozómy: $2n = 35$, meióza nepravidelná.

Poznámka. Na našom území sa predovšetkým v prách I. Kláštorského rozlišovala *R. sherardii* Sm. s. str. od *R. scabriuscula* auct. non Sm. Pre *R. scabriuscula* sa uvádzali ako rozlišovacie znaky kvetné stopky dlhšie ako šípky (až 20 mm) a lístky jemne dvojito ostro pílkovité, naproti tomu *R. sherardii* s. str. so stopkami rovnako dlhými ako šípky, častejšie aj kratšie (6 mm), s lístkami hrubo pílkovitými. Mnohotvárnosť *R. sherardii* zahŕňa však všetky takéto tvary, a preto je nelogické a nepraktické ďalej ich rozlišovať, najmä ak ich výskyt nie je postačujúco geograficky podložený.

Biológia, ekológia. Nanofanerofyt. Tvar opieravej liany sa doteraz nepozoroval. Kvitnutie jún. V kultúre doložený vek individuá viac ako 20 rokov. Rastie roztrúsené v lesných pláštoch a nezarastených medziach alebo v húštinách pozdĺž vodných tokov, ale aj na výslnných a skalnatých stráňach a medzi skalnými štrbinami. Maximum: ca 1500 m n. m., okr. 22, Siná (Deyl 1938 PR).

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 5. Overené doklady zväčša iba z karpatskej oblasti.